



GOOD BLADDER HABITS CAN HELP IMPROVE BLADDER CONTROL

You need good bladder habits for a healthy life.

Poor bladder habits can lead to poor bladder control, and even wetting yourself. Here are some easy steps that everyone can take to keep a healthy bladder.

HINTS TO KEEP YOUR BLADDER HEALTHY

Step 1 – Use good toilet habits

- It is normal to go to the toilet 4 to 8 times a day and no more than twice a night.
- Don't get into the habit of going to the toilet "just in case." Try to go to the toilet only when your bladder is full and you need to go. (Going to the toilet before you go to bed is fine).
- Take your time so that your bladder can empty. If you rush, and do not empty your bladder fully, over time, you could get a bladder infection.
- Women should sit to go to the toilet. Do not hover over the toilet seat.

Step 2 – Keep good bowel habits

- Eat lots of fruits and vegetables and stay active to keep your bowels regular.
- Do not strain when using your bowels as this can weaken your pelvic floor muscles (the muscles that help your bladder and bowel control).

Step 3 – Drink plenty of water

- Drink 1.5 - 2 litres of fluid each day unless your doctor says this is not okay.
- Cut down on how much caffeine and alcohol you drink. These may upset your bladder. Do not drink too much coffee, tea or cola. Instant coffee has less caffeine than brewed coffee. Tea has less caffeine than coffee.

JÓ VIZELÉSI SZOKÁSOK SEGÍTHETNEK A VIZELETVISSZATARTÁST JAVÍTANI

Egészséges élethez jó vizelési szokásokra van szükség.

Rossz vizelési szokások rossz vizeletviSSZatartáshoz vezethetnek, és még be is pisilhet. Itt van néhány könnyű eljárás, amit bárki megtehet, hogy egészséges maradjon a húgyhólyagja.

JAVASLATOK ARRRA, HOGYAN TUDJA A HUGYHÓLYAGJÁT EGÉSZSÉGESEN TARTANI

1. lépés – Legyenek jó vécézési szokásai

- Normális az, ha nappal 4-8 alkalommal és éjszaka legfeljebb kétszer megy vécére.
- Ne szokjon rá arra, hogy vécére menjen azért, "mert talán kell". Próbáljon csak akkor vécére menni, amikor tele van a húgyhólyagja és amikor pisilnie kell. (Ha lefekvés előtt vécére megy, az rendben van).
- Várja meg hogy kiürüljön a húgyhólyagja. Ha siet és nem üríti ki a húgyhólyagját teljesen, akkor idővel húgyhólyagfertőzést kaphat.
- Nőknek ülniük kell a vécén. Ne tartsa magát a vécéülés fölött.

2. lépés – Legyenek jó székelési szokásai

- Egyen sok gyümölcsöt és zöldséget, és maradjon aktív annak érdekében, hogy rendszeres széklete legyen.
- Ne erőlködjön, amikor székel, mivel az gyengítheti a medencealapiszmaid (a vizelet- és a székletviSSZatartást segítő izmokat).

3. lépés – Igyon sok vizet

- Igyon 1.5 – 2 liter folyadékot minden nap, hacsak az orvosa nem ad javaslatot ez ellen.
- Csökkentse a koffein és alkohol fogyasztását. Ezek megzavarhatják a húgyhólyagját. Ne igyon túl sok kávé, teát vagy kólát. A nescaféban kevesebb koffein van, mint a lefőzött kávéban. A teában kevesebb koffein van, mint a kávéban.



Step 4 – Look after your pelvic floor muscles

- Keep your pelvic floor muscles strong with pelvic floor muscle training.
- You can get a Pelvic Floor Muscle Training leaflet for Men, or for Women.
- See your doctor, physiotherapist or continence nurse to check that you are training your muscles the right way.

Step 5 – Seek help from your doctor, physiotherapist or continence nurse if you:

- wet yourself, even a few drops, when you cough, sneeze, laugh, stand, lift or do sports or other activity;
- have an urgent need to pass urine, have a strong feeling of not being able to hold on, or often don't get to the toilet in time;
- pass small amounts of urine, often and regularly. That is more than 8 times per day in small amounts (less than about what a tea cup holds);
- have to get up more than twice in the night to pass urine;
- wet the bed over the age of five years;
- have trouble starting your stream of urine, or have a stream that stops and starts instead of a smooth flow;
- strain to pass urine;
- feel that your bladder is not empty when you have passed urine;
- have burning or pain while passing urine;
- have to give up things you enjoy like walking, aerobics or dancing because of poor bladder or bowel control; or
- have any change in your regular bladder habits that you are worried about.

4. lépés – Ügyeljen a medencealapizmaira!

- Erősítse a medencealapizmait a medencealapizom edzésével.
- Kaphat a férfiak és nők számára összeállított szórólapot, amely a medencealapizom edzéséről szól.
- Keresse fel orvosát, fizioterapeutáját vagy kontinencia ápolóját, hogy megtudja, hogy helyesen edzi-e az izmait.

5. lépés – Kérjen segítséget az orvosától, a fizioterapeutájától vagy a kontinencia ápolójától, ha:

- bepisil, még ha csak egy pár csepp csöpög is, amikor köhög, nevet, áll, felemel valamit vagy sportol vagy valami mást csinál;
- sürgősen pisilnie kell, erősen úgy érzi, hogy nem tudja visszatartani a pisilést, vagy gyakran nem ér időben a vécére;
- gyakran és rendszeresen keveset pisil. Azaz, naponta több, mint nyolcszor kis mennyiségben (kevesebb, mint egy teás csészényit) pisil;
- éjszaka több, mint kétszer fel kell kelnie pisilni;
- ha öt évesnél idősebb, és az ágyba bepisil;
- ha nehezen indul meg a pisilés, vagy megáll és újraindul ahelyett, hogy egyenletesen folyna;
- erőlteti a pisilést;
- úgy érzi, hogy a húgyhólyagja nem üres azután, hogy pisilt;
- égető érzése vagy fájdalma van, miközben pisil;
- abba kell hagynia olyan dolgokat, amiket szeret, mint például a sétálást, az aerobikot és a táncot rossz vizelet- vagy székletvisszatartás miatt; vagy
- olyan változás állt be a rendszeres vizelési szokásaiba, ami miatt aggódik.





SEEK HELP

Qualified nurses are available if you call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66* (Monday to Friday, between 8.00am to 8.00pm Australian Eastern Standard Time) for free:

- Information;
- Advice; and
- Leaflets.

If you have difficulty speaking or understanding English you can access the Helpline through the free Telephone Interpreter Service on 13 14 50. The phone will be answered in English, so please name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language. Tell the interpreter you wish to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. All calls are confidential.

Visit bladderbowel.gov.au or continence.org.au/other-languages

* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

KÉRJEN SEGÍTSÉGET

Szakképzett ápolók állnak rendelkezésére ha felhívja az Országos Kontinencia Telefonos Segélyszolgálatot a 1800 33 00 66* számon (hétfőtől péntekig, reggel 8-tól este 8-ig az ausztrál keleti időzónában) ingyenesen:

- Információ;
- Tanács; és
- Szórólapok.

Ha problémái vannak az angol nyelvvel, kapcsolatba léphet a Telefonos Tolmács Szolgálattal a 13 14 50 számon. Először valaki válaszol a hívásra angolul, mondja be, hogy milyen nyelven beszél és várjon a telefonon. Kapcsolatba fog kerülni egy tolmáccsal aki beszél az Ön nyelvét, mondja meg neki, hogy az Országos Kontinencia Telefonos Segélyszolgálattal akar beszélni a 1800 33 00 66 számon. Várjon a telefonon, hogy kapcsolják és a tolmács segíteni fogja a kontinencia ápolójával való beszélgetésben. Minden beszélgetés bizalmas.

Látogassa meg a bladderbowel.gov.au vagy continence.org.au/other-languages weboldalakat

* A mobil telefonról történő hívás az annak megfelelő díjba kerül.